

## יציבות תמיסות לשימוש חיצוני ותמיסות לחיטוי לאחר פתיחה

תמיסה	יציבות
ALCOXIDINE - TEVA	3 חודשים
ALCOHOL 30% (ייצור בית מרקחת)	3 חודשים
ALCOHOL 70% (ייצור בית מרקחת)	3 חודשים
ALCOHOL 95% (ייצור בית מרקחת)	עד תום השימוש
ALCO-GEL (ד"ר פישר)	עד תום השימוש
ALCO-GEL CREAM (ד"ר פישר)	עד תום השימוש
IODO-VIT SOL 10% - VITAMED	6 חודשים
IODIFLOR (פלוריש) - תרחיץ	6 חודשים
OCTENILIN - תמיסת חיטוי לפצעים	8 שבועות-מותנה בסגירה מיידית והרמטית של הבקבוק
SEPTOL - TEVA	2 חודשים
SEPTAL SCRUB - TEVA	2 חודשים
SEPTALON - TEVA	שבוע לאחר הדילול
SEPTADIN (פלוריש)	עד תום השימוש
SAVIOR - TEVA	שבוע לאחר הדילול

Xylocaine Spray	עד תום השימוש
-----------------	---------------

**תמיסות לשימוש חיצוני בייצור בית המרקחת (מלבד מי חמצן 3%)**

3 חודשים לאחר פתיחה

- יש לכתוב תאריך פתיחה על כל בקבוק שנפתח.
- יש לשים לב לתאריך התפוגה של המוצר.